



CLINIC® TF

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) pro ředění vodou, určený k hubení vytrvalých i jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, v hrachu, v bobu, ve lnu setém (olejném), v cibuli, v póru, v cukrovce, ve vodnici, v tuřínu, v chřestu, v obilninách, v řepce olejce, v hořčici, v lesních kulturách a k likvidaci nežádoucí vegetace na veřejně přístupných plochách a ostatních plochách.

Název a množství účinné látky: glyfosát (ISO) 360 g/l ve formě glyfosátu
IPA soli 486 g/l

- ničí i vytrvalé podzemní části plevelů
- ničí všechny vzešlé semenné plevele

NÁVOD K POUŽITÍ:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pšenice, ječmen, oves, hrách, bob, len setý (olejný), hořčice, řepka olejka, cibule, pór, cukrovka, vodnice, tuřín	výdrol obilnin, plevele jednoleté	1,5 l/ha	AT	1) preemergentně 3) 2 dny před setím	
chřest	plevele jednoleté, plevele vytrvalé	5 l/ha	AT	1) preemergentně	
louky a pastviny	obnova TTP	6 l/ha	5	3) 5 dnů před kultivací nebo sečením	

nezemědělská půda, nepropustné půdní povrchy, propustné půdní povrchy	plevele jednoleté, plevele vytrvalé	5 l/ha	-	1) s výjimkou oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel	
veřejně přístupné plochy	plevele jednoleté, plevele vytrvalé	5 l/ha	-		
1) Plodina, oblast použití	2) Š kodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizeň
jádroviny, peckoviny	plevele jednoleté, plevele vytrvalé	5 l/ha	AT		
mimoprodukční plochy	plevele jednoleté, plevele vytrvalé	5 l/ha	AT	3) 5 dnů před setím nebo zpracováním půdy	
lesní porosty	plevele jednoleté, plevele vytrvalé	5 l/ha	7	1) před výsadbou 3) 7 dnů před výsadbou	
lesní porosty	plevele jednoleté, plevele vytrvalé, dřeviny plevelné	8 l/ha	-	1) po výsadbě	4) aplikace s kryty
lesní porosty	plevele jednoleté, plevele vytrvalé	3 l/ha	-	1) po výsadbě	4) aplikace plošná
lesní hospodářství	potlačení pařezové výmladnosti	10 %	AT		4) postřik
orná půda	plevele jednoleté, plevele vytrvalé	5 l/ha	AT	1) před setím, před výsadbou	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní (-) -

ochrannou lhůtu není nutné stanovit

ZÁKAZY A OMEZENÍ:

Plodina, oblast použití	Zákaz, omezení
-------------------------	----------------

louky a pastviny

Zákaz spásání nebo sklizně ošetřených rostlin za účelem zkrmování hospodářským zvířatům.

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ:

Aplikujte na aktivně rostoucí plevle. Pýr plazivý by měl mít v době aplikace vyvinuto 4–5 listů (10–15 cm). Vytrvalé dvouděložné plevle jsou nejcitlivější na počátku kvetení. Jednoleté trávy by měly mít vyvinuty alespoň 5 cm listové plochy a jednoleté dvouděložné plevle alespoň 2 pravé listy.

Přípravek nedostatečně účinkuje na přesličku rolní.

Před výsevem plodin se doporučuje odumřelou organickou hmotu rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
aplikační dávka 8 l přípravku/ha	5	5	5	5
aplikační dávka 5 a 6 l přípravku/ha	5	5	5	5

